


تحديد جرعة عقار زيثروماكس® (Zithromax®) بناءً على الطول والعمر المستعلق الفموي والأقراص تموز / يوليو (٢٠١٨)

≤ ١٥ عاماً: ٤ أقراص

الأطفال بعمر ٧ سنوات أو
أكثر وما دون ١٥ سنة الذين
يتلقون الأقراص

الأقراص

الطول (سم)



مراهق

الأطفال بعمر ٦ أشهر أو أكثر
وما دون ٧ سنوات الذين
يتلقون المستعلق الفموي*

المستعلق الفموي (POS)
(مسحوق المستعلق الفموي)
الطول (سم) الجرعات (مل)

138 <	٢٥ مل
138 - 130 <	١٩ مل
130 - 122 <	١٦ مل
122 - 110 <	١٤ مل
110 - 98 <	١٢ مل
98 - 87 <	١٠ مل
87 - 76 <	٨ مل
76 - 65 <	٦ مل
65 - 54 <	٤ مل
54 - 50 <	٢ مل



طفل

الأطفال الرضع دون ٦ أشهر من
العمر: مرهم (TEO)
(مرهم تتراسكلين للعين)



رضيع

*ملاحظة: حتى لو كان عمر الشخص أكبر من ٧ سنوات وكان طويل القامة بما يكفي ليُعطى أقراصاً، فإذا وُجِدَت أي مؤشرات على أنه سيواجه صعوبة في بلع القرص، يجب حينها أن يُعطى مسحوق المستعلق الفموي.

زيثروماكس® (Zithromax®) إرشادات تحديد الجرعة تموز/يوليو (٢٠١٨)

تحديد الجرعات وفقاً للفئة السكانية في حملة إعطاء الدواء على نطاق واسع لداء التراخوما

المُستحضّر الدوائي
مُرهم تتراسكلين للعين (TEO)

الفئة المستهدفة في حملة إعطاء الدواء على نطاق واسع
الأطفال بعمُر ٦-٠ أشهر

تُحدّد جرعة مسحوق المُستعلق الفموي للأطفال
(POS) وفقاً للطول

الأطفال بعمُر ٦ أشهر إلى ٧ سنوات (بغضّ النظر عن الطول)
الأفراد الذين يقل طول قامتهم عن ١٢٠ سم (بغضّ النظر عن العُمُر)
الأفراد الذين يواجهون صعوبة في ابتلاع الأقراص أو لا يرتاحون لتناولها

تُحدّد جرعة الأقراص وفقاً لطول القامة
تُحدّد الجرعة بـ ٤ قرص

الأفراد الذين يزيد طول قامتهم عن ١٢٠ سم وتتراوح أعمارهم بين ٧ سنوات و ١٥ سنة
الأفراد بعمُر ١٥ سنة فما فوق

معالجة الأطفال بعقار زيثروماكس®

لا يجوز إطلاقاً إجبار أي طفل على تناول العقار زيثروماكس®.

قد تثير أماكن التوزيع الرهبة بين الأطفال. فإذا كان الطفل غير متعاون أو ظهر عليه القلق، يكون أحد الوالدين أو الوصي عليه هو الشخص المناسب لإعطائه عقار زيثروماكس® لتخفيف قلق الطفل.

إذا كان الطفل غير متعاون أو ظهر عليه القلق، ينبغي للموزّع أن يشير على أحد أبوي الطفل بأن يأخذه إلى زاوية أكثر هدوءاً لإعطائه الجرعة بهدوء وعلى مرأى من الموزّع.

عند إعطاء عقار زيثروماكس® لأحد الأطفال، لا يجوز بتاتاً إغلاق أنف الطفل أو هزّ جسمه أو إمالة رأسه إلى الخلف عنوةً لإجباره على ابتلاع الدواء.

إذا امتنع الطفل عن تناول الدواء فينبغي للموزّع تسجيل رفض الطفل للدواء والانتقال إلى الشخص التالي في الطابور. حتى لو كان عُمر الشخص أكبر من ٧ سنوات وكان طويل القامة بما يكفي ليُعطى أقراصاً، فإذا وُجدت أي مؤشرات على أنه سيواجه صعوبة في بلع القرص، يجب حينها أن يُعطى مسحوق المُستعلق الفموي.

الهدف

عدم حدوث أي أحداث عكسية بسبب الاختناق

الهدف

إدارة علاجات الأطفال بطريقة أفضل