

# Dosagem dos comprimidos e suspensão oral em pó (SOP) de Zithromax<sup>®</sup> Baseada na Altura e Idade

Julho de 2018

**Bebés com menos de 6 meses: TEO**

(pomada oftálmica de tetraciclina)



Bebé

SOP (Suspensão Oral em Pó)	
Altura (cm)	Dosagem (ml)
> 138	25 ml
> 130-138	19 ml
> 122-130	16 ml
> 110-122	14 ml
> 98-110	12 ml
> 87-98	10 ml
> 76-87	8 ml
> 65-76	6 ml
> 54-65	4 ml
50-54	2 ml


Crianças de 6 meses a 7 anos de idade que recebem SOP \*



Criança

**Comprimidos**

Altura (cm)



Crianças de 7 a 15 anos de idade que recebem comprimidos



Adolescente

≥ 15 anos de idade : 4 comprimidos



Adulto

\*Nota: Mesmo que o indivíduo tenha mais de 7 anos e seja alto o suficiente para receber um comprimido, se houver alguma preocupação de que ela possa vir a ter dificuldade para engolir um comprimido, ela deve ser dada a SOP

# Directrizes para a dosagem de Zithromax®

Julho de 2018

## OBJETIVO

(ZERO) EFEITOS  
COLATERAIS GRAVES  
DEVIDO AO  
ENGASGAMENTO

## OBJETIVO

MELHOR GESTÃO DOS  
TRATAMENTOS PARA  
CRIANÇAS

### DOSAGEM POR GRUPO DE POPULAÇÕES PARA AS MDAs DE TRACHOMA

Grupo Alvo de MDA	Formulação
Crianças de 0 a 6 meses	TEO (pomada oftálmica de tetraciclina)
Crianças de 6 meses a 7 anos de idade (independentemente da altura) Indivíduos com menos de 120 cm (independentemente da idade) Indivíduos com dificuldades em engolir comprimidos ou desconfortáveis para tomar comprimidos	SOP (Suspensão Oral em Pó) dosagem de acordo com a altura
Indivíduos com mais de 120 cm e entre as idades de 7 e 15 anos de idade.	dosagem do comprimido de acordo com a altura
Indivíduos com 15 anos de idade ou maiores	dose de 4 comprimidos

### TRATAR CRIANÇAS COM ZITHROMAX®

Nenhuma criança deve ser forçada a ser administrada o Zithromax®.

Os sítios de distribuição podem ser intimidantes para as crianças. Se a criança não for cooperativa ou estiver ansiosa, o parente ou guardião é a pessoa correta para administrar o Zithromax® à criança para reduzir a ansiedade da criança.

Se a criança não for cooperativa ou estiver ansiosa, o distribuidor deve instruir o parente a levar a criança a um local mais calmo para administrar a dose com calma, sob supervisão do distribuidor.

Ao administrar o Zithromax® a uma criança, NUNCA segure o nariz da criança, agite a criança ou force a sua cabeça para trás para forçar a criança a engolir.

Se a criança resistir, o distribuidor deve registar a criança como se tivesse recusado e deve passar para a próxima pessoa na fila.

Mesmo que a criança tenha mais de 7 anos e seja alto o suficiente para receber um comprimido, se houver alguma preocupação de que ela possa vir a ter dificuldade para engolir um comprimido, ela deve ser dada a SOP