

# Dosificación de Zithromax® Polvos para Suspensión Oral (PSO) y Tabletas basada en talla y peso

Julio de 2018

**Bebes menores de 6 meses: TEO**  
(Tetraciclina unguento oftálmico)



Bebé

PSO (Polvo para Suspensión Oral)	
Talla (cm)	Dosificación (ml)
> 138	25 ml
> 130-138	19 ml
> 122-130	16 ml
> 110-122	14 ml
> 98-110	12 ml
> 87-98	10 ml
> 76-87	8 ml
> 65-76	6 ml
> 54-65	4 ml
50-54	2 ml

Niños de 6 meses a 7 años que reciben PSO \*




Niño

**Tabletas**  
Talla (cm)

> 138	○ ○
	○ ○
120 - 138	○ ○

Niños en edades entre 7 y 15 años recibiendo tabletas



Adolescente

≥ 15 años:  
4 tabletas



Adulto

\*Nota: Aun cuando el individuo es mayor de 7 años y lo suficientemente alto para que se le suministre una tableta, si hay alguna preocupación de que él o ella pueda tener problemas para tragar una tableta, se le deberá proporcionar el PSO

# Guías de dosificación de Zithromax®

Julio de 2018

## Dosificación por grupo poblacional para la Administración Masiva de Medicamentos (AMM) contra el tracoma

Grupo meta para MDA	Formulación
Niños de 0 a 6 meses	Tetraciclina ungüento ocular
Niños en edades entre 6 meses y 7 años (independientemente de su talla) Individuos por debajo de 120cm (independientemente de su edad) Individuos con dificultad para tragar tabletas o incomodos tomando tabletas	Polvo para suspensión oral (PSO) dosificadas de acuerdo con la talla
Individuos más de 120 cm de estatura y en edades entre 7 y 15 años	Tabletas dosificadas de acuerdo con la talla
Individuos con 15 años o más	Dosis de 4 tabletas

## Tratando niños con Zithromax®

Ningún niño debe ser forzado a tomar Zithromax®.

Los lugares de distribución pueden ser intimidantes para los niños. Si el niño no coopera o está ansioso, el padre o tutor es la persona correcta para administrar el Zithromax® al niño para disminuir su ansiedad.

Si un niño no coopera o está ansioso, el distribuidor debe instruir a los padres a llevar al niño a un lugar más tranquilo para administrarle la dosis con calma a la vista del distribuidor.

Mientras administra el Zithromax® a un niño, NUNCA le tape la nariz, sacuda al niño o fuerce la cabeza hacia atrás para obligarlo a tragar.

Si el niño se resiste, el distribuidor deberá registrar que el niño rehusó y pasar a la siguiente persona en la fila.

Aun cuando el niño sea mayor de 7 años y lo suficientemente alto para suministrarle una tableta, si existe alguna preocupación de que el niño pueda tener dificultad para tragar la tableta, se le deberá proporcionar la suspensión oral (PSO).

---

# META

CERO EVENTOS  
ADVERSOS SERIOS  
DEBIDO A ASFIXIA

---

---

# META

MEJOR MENEJO DE  
TRATAMIENTOS A  
NIÑOS

---